

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS

DE

T E N E S M O.

QUAM

ANNUENTE DEO TER OPT. MAX.

Ex Auctoritate Magnifici Rectoris

D. FRANCISCI VAN OUDENDORP,
HISTORIARUM ET ELOQUENTIÆ PROFESSORIS.

NEC NON

*Amplissimi SENATUS ACADEMICI Consensu,
& Nobilissimæ FACULTATIS MEDICÆ Decreto,*

PRO GRADU DOCTORATUS,

Summisque in MEDICINA Honoribus & Privilegiis, ritè
ac legitimè consequendis,

Eruditorum Examini subjicit

RICHARDUS MILNES,
ANGLUS.

Ad diem 7. Maji 1751. hora locoque solitis.



LUGDUNI BATAVORUM,
Apud GERARDUM POTVLIET, 1751.

DISSECTATIO MEDICA
IN ANATOMIA

TENESMO.

QUAM

ANNUENTE REGIA SOCIETATE

EDITIONE SECUNDA

D. PRAEPOSITI VAN OUDENDORP
HISTORIA ET PROPRIETAS

PER

REGIA ACADEMIA
MEDICAE AMSTELÆDAMI

PRO GRADU DOCTORATUS

Obtinens in Medicina Honoris & Privilegii, die
seu in fine confectio

Amstelredamum, die 17 Junii 1771

RICHARDUS MILNUS


Alumnus

Atque in hoc die legitur



LUGDUNO BATAVO

AMSTELÆDAMI TOTVALENTI



DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS

DE

TENESMO.



enesmus constans est ad desiden-
dum conatus in quo nihil vel per-
paucum, quidpiam mucosum,
subcruentum, purulentum vel ex
hisce mistum ejicitur.

Pro parte primariò affectâ dif-
fert hic morbus: alius symptomaticus, alius
idiopathicus est; hic a proprio Intestini Recti
vitio, ille a labe partium vicinarum oritur, uti
postea clarius patebit.

A 2

Cum

Cum ad alvum in statu sano exonerandam necesse sit ut fæces alvinæ ad extremum Recti vi peristalticâ propulsæ, mole, pondere vel acridine, ejus fibras irritent indeque levatores ani, diaphragma, & musculi abdominales ex consensu contrahantur, ut assidua fiat egerendi cupiditas, constanti in extremo Recto irritatione opus est.

Ex his apparet, quod omnes causæ, quæ irritationem in Recto indefinenter producant, Tenesimum remotè parient. Has ordinis gratiâ ad duas classes satis commodè referre possumus. 1. causæ quæ in cavo Recti vel in ejus fibris hærent, Tenesimum idiopathicum inducentes. 2. causæ extra Rectum sitæ, quæ Tenesimum Sympathicum gignunt.

Inter causas Tenesmi idiopathici enumeranda est muci intestinalis inopia. Ex Anatomicis notum est internam intestinorum superficiem, quæ ex papillis nervosis tota fere constat, muco ex glandulis secreto obliniri, sicque ab acrimonia vel asperitate fæcum præterlabentium defendi. Si hic mucus Rectum investiens a quâcunque causâ abradatur, ut a nimio purgantium vel clysmatum usu, fibræ ejus sensiliores evadent,
&

& cum partibus fæcum acribus omnino obnoxia sint, nimis facile convellentur. Idem in vesicâ urinaria sæpissime contingit, cujus mucos deter-
so oritur urinæ ardor unâ cum molesta stranguria.

Mucus Intestinalis acrimoniâ modò peccans, hunc morbum producere potest. Huic causæ fortasse tribuendus est Tenesmus qui diarrhæas, dysenterias comitari vel sequi consuevit; in his morbis enim totus intestinorum tractus acribus humoribus scatet. Sydenhamus (a) in historia constitutionis epidemicæ quæ dysenteriis maxime favebat, observat, dysenteriam tunc temporis regnantem in Tenesmum haud raro desivisse, quem reliquiis materiæ morbificæ a superioribus intestinis in Rectum detrufis ascribit.

Originem debet hoc malum aliquando inflammationi Recti. Omnis corporis pars, inflammata, sensu exquisitiori ob fibrarum summam tensionem pollet & impressiones ut debiles vividius percipit. Rectum itaque inflammatione correptum acutius sentiet, ac a materiis in eo contentis perpetuas patietur irritationes quæ Tenesmum excitare valent.

Ulcus

(a) Vid. pag. 180.

Ulcus Recti, fistulave ani hunc morbum sæpenumero pariunt: ex his materia purulenta in cavum Recti effluens, podicem acrimoniâ suâ vellicat, & ad alvum deponendam incessanter sollicitat. Sic pus ex vomica pulmonali in Asperæ Arteriæ ramos emanat, fibrasque hic loci sensiles irritat, unde tussis Pthificorum perpetua.

Ortum ducere potest a vermibus in Recto latitantibus, qui vice stimuli fungentes, morfib. subtilibusque tunicas Recti impetunt & ad frequentiores contractiones eas provocant; Hinc oritur constans dejiciendi cupiditas. Vermes in Infantibus (quorum compages tenera & admodum mobilis est) diras universi corporis convulsiones nec non insultus Epilepticos quotidie producere observantur: non mirum ergo est, hos in Recto congestos Tenesimum efficere posse.

Hæmorrhoides hujus mali causa multoties repertæ sunt. Hæ si magnopere tumeant, aut vehementer doleant, Recto molestias creabunt, uti facile patet, motusque vibratorios ibi suscitabunt.

Sic de præcipuis Tenesmi idiopathici causis egimus, pauca de causis Sympathici dicenda restant.

In

In hac classe recenseri imprimis merentur, Vesicæ calculus uterique prægnatio. Calculus sua acutie vel pondere fibras Vesicæ distrahendo divellit, & ob harum partium consensum, Rectum simul affici solet; sic calculo laborantes Tenesmo raro vacare deprehenduntur. Fætus in utero contentus, Rectum utero contiguum premendo proritat unde gravidis frequens occurrit hoc incommodum, præsertim sub gestationis finem. Præterea prægnantes Hæmorrhoidibus ex eadem causa, ex uteri nempe in Rectum pressione ortis, infestantur.

Tenesmus etiam oriri potest a disuria, ischuria, stranguria, inflammatione vel ulcere Vesicæ, denique ab omnibus hujusce vitiis. Namque talis est Rectum inter & Vesicam nexus, quod cum se invicem nunquam non consentiant.

Hic morbus labis hystericæ vel hypochondriacæ frequens est effectus. Hi, quos excruciat hoc malum, spasmodicos motus a fluxu spirituum Animalium inordinato oriundos, in variis corporis partibus experiuntur; si pulmones ingruat morbi atrocis impetus, respirandi difficultatem tussimque asthmaticam affert; si
re-

renes adoriatur, dolorem Nephritidem maxime referentem, creat; ut verbo dicam, quamcunque corporis partem aggreditur, morbos huic parti proprios, probe æmulatur, teste Sydenhamo (*a*). Vis ejus in rectum decumbens Tenesnum efficiet, qui eo usque durat donec solvitur sponte vel artis auxilio spasmus Recti constrictorius.

Multæ fortasse sunt aliæ causæ Tenesmi tam symptomatici quam idiopathici, quin supra memoratæ cæteris longe frequentiores in Praxi observatæ sunt, ad effectus adeo hujus morbi enarandos accingemus nos.

Affiduum adest ad egerendum incitamentum, a perpetuo Recti stimulo profluens: Mucus a Recti parietibus abrasus speciem ramentorum præ se ferens medicos nonnunquam fallit; Observata medica tamen docent tunicam villosam dictam humoribus copiosis hic affluentibus maceratam vel eorundem acrimonia erosam quandoque secedere & ramentorum specie in dejectionibus alvinis comparere (*b*): materia excreta striis sanguineis variegatur, ruptis vel detritis aliquot

(*a*) Vid. Epist. de Morb. Hyster.

(*b*) V. Tulp. lib. 3. cap. 17.

vasculis per tunicas Recti decurrentibus: si ad-
 sit fistula ani vel ulcus Recti, pus suppeditans,
 mucus pure commistus excernitur: podex acriter
 dolet: dolor dejectionis tempore, ob violentam
 partis affectæ concussionem, maxime intenditur:
 Anus, morbo diutius excurrente, tædio affectus
 procidit: corpus lente exhauritur, facies pallida
 collabitur, prosteruntur vires, quæ omnia symp-
 tomata non tantum ex inanitione oriuntur, ve-
 rum etiam inde quod frequenter alvum excer-
 nere coactus, æger, delassatur & somnum cape-
 re nequit; *fessus enim homo ex continua exsur-
 rectione insomnis fit* Hipp. Prognost.: a magna
 harum partium conquassatione inflammatio (hu-
 jus mali effectus æque ac causa) nasci potest,
 quæ interdum ad suppurationem tendit, lenta
 dein febris cum tabe totius corporis conjuncta
 ægrum depascitur. Si Tenesmus, nullis induciis
 datis, violente urgeat, diuque duret, febre, &
 convulsionibus stipatur, in mortem abeuntibus.

Hic morbus cognitu facilis, a Dysenteria
 cum qua sæpe complicatur, discrepat in eo quod
 tormina quæ in Dysenteria per totum Intestino-
 rum decursum porriguntur, in Tenesmo ad Re-
 ctum modò referri solent; materia etiam excre-

B

ta

ta in priori longe copiosior est quam in posteriori; insuper desidendi cupiditas in Dysenteria minus frequens, in Tenesmo fere nunquam cessat.

Causæ ejus investigatu sæpius satis difficiles sunt, eas tamen assequetur plurimum medicus si ad antecedentia & comitantia animum diligenter adhibeat. An a vesicæ calculo, vel graviditate, an ab Hæmorrhoidibus, ab inflammatione aut ulcere Recti vel ani fistulâ, an a morbo Hysterico producat, signis quibus indicantur hæ affectiones, liquido constabit. An ab ascaridibus vel lumbricis, dignoscetur, a vermium ejectione vel ex eo quod ager verminationi antea obnoxius fuerit. Tandem si omnium aliorum affectuum signa abfuerint, & aliunde se prodant nimix humorum falsedinis indicia, tunc ab acrimoniâ muci Intestinalis Tenesimum pendere verismile videtur.

Molestiâ tædioque plenus hic morbus sæpe evadit, quin si in principio sit, & ab aliqua levi causa pendeat, per se periculo prorsus vacat.

Tenesimum facile tolli & nunquam per se hominem jugulare asserit Celsus (a). Verum si al-

(a) Lib. 4. cap. 19.

tas egerit radices & a causis gravissimis natales duxerit, nimirum ab Inflammatione Recti aut ejus ulcere, ægri in periculo minime contemnendo versantur. In mulieribus pragnantibus, si in longum trahatur, abortum minitatur. Sic (a) apud Hippocratem; *mulieri uterum gerenti si superveniat Tenesmus, abortum facit.* Musculi enim fæcum expulsionem destinati, ad fætus exclusionem inserviunt, validis itaque musculorum abdominalium & diaphragmatis inter excernendum nixibus uterus fortiter pressus, fætum immaturum præpropere excutere possit. De Tenesmo, qui dysenteriam subsequitur, ita loquitur Sydenhamus (b), *licet adultis & gravidis exitialis sit, Infantibus perbenignus reperitur, qui per aliquot menses ab eo afficiuntur, modo res naturæ permittatur.*

Causis, effectibus, diagnosi & prognosi hujus morbi sic breviter expositis, restat ut pauca ejus medelam spectantia adhuc proferamus. Hanc pro causarum diversitate variare oportet. Si ab Inflammatione Recti ortum ducat, vænesectione pro necessitate repetita, cæteraque medicamina in-

(a) Aph. 27. S. 7.

(b) Vid. Sydenh. Op. 180.

inflammationi dicata, curationem absolvent; si a Recti ulcere, suffimigia, clysmata, suppositoria ex abstergentibus, consolidantibus, adstringentibus indicantur: si a fistula ani, chirurgicâ operatione opus est; si a vermibus, amara, oleosa, mercurialia, venerea purgantia exhiberi possunt: si ab Hæmorrhoidibus, balnea, fomenta, cataplasmata, Hæmorrhoidum sectio, vel earum frictio cum foliis ficuum egregiè juvant; si a muci inopia, humectantia, demulcentia, anodyna, conveniunt; si symptomaticus sit, & a vesicæ affectionibus enascatur, in usum revocanda sunt remedia, quæ his morbis debellandis idonea sunt; si morbi Hysterici proles sit, antihysterics, opiatis optime compescitur.

Tenesmus, qui dysenterici supervenit, hæcque cessante interdum diu durat, medendi methodum sibi propriam exigit: topicis parti dolenti applicatis, minime cedit, quin horum usu sæpe exasperatur, uti observat Sydenhamus in loco ante citato, qui multiplici experientiâ compertum habuit, hanc Tenesmi speciem, vires ægri restaurando, optime curari. Hoc fit, usu diætæ analepticæ, atque cardiacorum quæ robur ægro subministrant; quo redeunte, Tenesmus sponte se surripit..